



分块矩阵

林胤榜

同济大学数学科学学院

2023年10月27日

主要内容

1 分块矩阵

2 分块矩阵的运算

3 分块矩阵的应用

分块矩阵

评述

将大矩阵分成若干小块矩阵, 可以给记号和计算带来便利.

分块矩阵

评述

将大矩阵分成若干小块矩阵, 可以给记号和计算带来便利.

对以下矩阵进行分块:

$$A = \left(\begin{array}{ccc|ccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & & \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & & & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}.$$

考虑它诱导的线性映射

$$L_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

的效果: 取 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$, 依据 A 的分块对 x 分块:

(很快能看到这样分块的原因.)

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix},$$

记分块以后的矩阵为

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ X_2 \end{pmatrix}.$$

则

$$\begin{aligned} L_A(x) &= Ax = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_{13}x_3 \\ a_{23}x_3 \\ a_{33}x_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11}X_1 \\ A_{21}X_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} A_{12}X_2 \\ A_{22}X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}X_1 + A_{12}X_2 \\ A_{21}X_1 + A_{22}X_2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

注意到, 这里子矩阵均可相乘.

总结: 分块矩阵的相乘和矩阵相乘的形式一致.

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}X_1 + A_{12}X_2 \\ A_{21}X_1 + A_{22}X_2 \end{pmatrix}.$$

定义

上面 A_{11} , A_{12} , A_{21} , A_{22} 称为**分块矩阵的子块**.

总结: 分块矩阵的相乘和矩阵相乘的形式一致.

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}X_1 + A_{12}X_2 \\ A_{21}X_1 + A_{22}X_2 \end{pmatrix}.$$

定义

上面 A_{11} , A_{12} , A_{21} , A_{22} 称为**分块矩阵的子块**.

注意: 对一个给定的矩阵, 可以有多种方式对矩阵进行分块.

分块矩阵的运算

- 1 同型分块矩阵可以逐块相加: 假设 A 和 B 是同型矩阵, 采用相同的分块法, 有

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 和 B_{ij} 是同型矩阵. 则

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}.$$

2 对于 $\lambda \in \mathbb{R}$ 或 \mathbb{C} ,

$$\lambda \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{m1} & \lambda A_{m2} & \cdots & \lambda A_{mn} \end{pmatrix}.$$

3 假设对矩阵 $A \in M_{m \times l}$ 和 $B \in M_{l \times n}$ 作以下分块

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

使得 A_{i1}, \dots, A_{it} 的列数分别等于 B_{1j}, \dots, B_{tj} 的行数
($1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq r$).

3 假设对矩阵 $A \in M_{m \times l}$ 和 $B \in M_{l \times n}$ 作以下分块

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix},$$

使得 A_{i1}, \dots, A_{it} 的列数分别等于 B_{1j}, \dots, B_{tj} 的行数 ($1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq r$). 则

$$AB = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix},$$

其中 $C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} \cdots + A_{it}B_{tj}$.

例子

求 AB :

$$A = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ \hline 3 & 4 & 5 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} A_{11} & O_{2 \times 2} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \text{ 和 } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix}.$$

注意到它们可以作为分块矩阵相乘:

$$AB = \begin{pmatrix} A_{11} & O_{2 \times 2} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_1 \\ B_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_1 + OB_2 \\ A_{21}B_1 + A_{22}B_2 \end{pmatrix}.$$

$$A_{11}B_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} (1 \ 1) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_{21}B_1 = (3) (1 \ 1) = (3 \ 3),$$

$$A_{22}B_2 = (4 \ 5) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = (13 \ 19), \quad \text{所以 } AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \\ \hline 16 & 22 \end{pmatrix}.$$

运算

$$4 \quad A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{s1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \text{ 则 } A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{1r}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}.$$

运算

4 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{s1} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, 则 $A^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{1r}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{pmatrix}$.

- 5 假设 $A \in M_{n \times n}$, 子块只在对角线上非零, 而且对角线上的子块均为方阵, 即

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & A_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \ddots & \\ & 0 & & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & A_s \end{pmatrix},$$

其中 A_1, \dots, A_s 均为 (可能不同大小的) 方阵,
则称分块矩阵 A 为**对角分块矩阵**, 且 $|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_s|$.

由性质 5 可知, 若对任意 i 均有 $|A_i| \neq 0$, 则 $|A| \neq 0$, 而且

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \mathbf{0} \\ & \ddots & \\ \mathbf{0} & & A_s^{-1} \end{pmatrix}.$$

例子

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \text{求 } A^{-1}.$$

例子

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}, \text{求 } A^{-1}.$$

注意到, 可以对矩阵进行分块使得它成为对角分块矩阵. 令

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}. \text{求 } B^{-1}: \text{首先, } |B| = -2, \text{然后 } B \text{ 的伴随矩阵为}$$

$$B^* = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}. \text{所以}$$

$$B^{-1} = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

则

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

分块矩阵的应用

命题

假设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. 那么 $A = 0$ 当且仅当 $A^T A = 0$.

证明.

(\implies) $A = 0$ 意味着 A 的各项均为零, 所以结论显然.

(\impliedby) 以列分块 A : $A = (a_1, \dots, a_n)$, 其中 $a_j \in M_{m \times 1}$, 则

$$0 = A^T A = \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ \vdots \\ a_n^T \end{pmatrix} (a_1, \dots, a_n) = \begin{pmatrix} a_1^T a_1 & a_1^T a_2 & \cdots & a_1^T a_n \\ \vdots & & & \vdots \\ a_n^T a_1 & a_n^T a_2 & \cdots & a_n^T a_n \end{pmatrix}.$$

特别地, $a_j^T a_j = 0$, $1 \leq j \leq n$.

$$\text{又 } a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix},$$

$$a_j^T a_j = (a_{1j} \quad \cdots \quad a_{nj}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = a_{1j}^2 + \cdots + a_{nj}^2,$$

所以 $\forall i, j, a_{ij} = 0$.

□

$$\text{又 } a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix},$$

$$a_j^T a_j = (a_{1j} \quad \cdots \quad a_{nj}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = a_{1j}^2 + \cdots + a_{nj}^2,$$

所以 $\forall i, j, a_{ij} = 0$.

假设 a 是一个列向量, 则 $a^T a$ 是它的长度.



$$\text{又 } a_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix},$$

$$a_j^T a_j = (a_{1j} \quad \cdots \quad a_{nj}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} = a_{1j}^2 + \cdots + a_{nj}^2,$$

所以 $\forall i, j, a_{ij} = 0$.

假设 a 是一个列向量, 则 $a^T a$ 是它的长度.



推论

假设 a 是一个列向量, 则 $a = 0$ 当且仅当 $a^T a = 0$.